



Житни култури
Резултати
'2025

Защото
всичко
идва от
ЗЕМЯТА!



МЕКА ЗИМНА ПШЕНИЦА

- ЧЕЗАРИО
- РУБИСКО
- САКРАМЕНТО
- НАБУКО
- КАРОНТЕ
- КАТУЛО
- ДЖОРДЖОНЕ

ЧЕЗАРИО

Силна хлебна пшеница с висок W-индекс

RGT ЧЕЗАРИО е много ранен сорт пшеница с много добра зрелост. Отлично съотношение между добив и протеини, както и число на падане по Хагберг. С характеристиките си на силна хлебна пшеница, RGT ЧЕЗАРИО е сорт, одобрен от Френската асоциация на мелничарите.

- Добър потенциал за братене и отлична продуктивност на класовете
- Отлично качество на зърното
- Безосилест сорт
- Ниски растения
- Устойчив на полягане
- Много добра зимостойчивост
- Отлични хлебопекарни качества
- Много високо P/L съотношение
- Толерантен на хлортолурун

Добра защитеност от основните болести по пшеницата, с отлична толерантност на мозайки, брашнеста мана и септориоза.

Препоръчителна сеитбена норма 500-550 к.с/кв. м



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

РУБИСКО

еталон в Западна Европа за пшеница от група А

- Ранна до средно ранна, осилеста, зимна мека пшеница
- Един от високо продуктивните и стабилни през годините сортове на пазара в Европа
- Ниски до средно високи растения
- С изключително силно и здраво стъбло, не поляга
- Идеален за биологични ферми поради отличния си фитосанитарен профил
- Добро поведение при отглеждане на пшеница след пшеница
- Лесно се адаптира към различни производствени условия
- Надежден добив дори в условия на суша
- Интензивно и екстензивно отглеждане


Препоръчителна сеитбена норма: 450 – 500 к.с./кв.м.*

Всички мерки за РЗ се изискват по-рано, отколкото при другите сортове на пазара.



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влажа (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хекто-литър
Северозападен	с. Лиляче	714	14,1	11,1	20,4	73,8
Северен Централен	с. Войново	800	8,3	14,0	27,7	76,9
	с. Тръстеник	793	9,4	13,1	23,3	72,5
Североизточен	гр. Шумен	548	9,0	14,3	27,9	68,5
Южен Централен	гр. Съединение	715	9,5	12,4	23,7	76,5
	с. Войсил	654	9,7	12,3	23,6	78,2
Югоизточен	гр. Ст. Загора	503	9,5	13,6	27,1	75,0

САКРАМЕНТО

пшеница за френски хляб

Сакраменто е ранен към средно ранен, средно висок, зимен сорт мека пшеница. С много висок потенциал на добив и добро качество на зърното.

- Справя се много добре при високи температури и лимитирани валежи
- Задоволителна студоустойчивост
- Силно брати, така че се справя добре и при късна сеитба
- Високи регенеративни способности след зимата
- Без проблеми формира качество на зърното, но за да се използва потенциала, се препоръчва да се отглежда на средни и силни терени и 3 дози азот
- Чувствителен към хлортолурун, който се съдържа в някои хербициди


С добра обща толерантност към заболявания. Добро поведение срещу фузариозно увяхване и дезоксиниваленол. Много добра толерантност срещу жълта и кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма: 450-500 к.с./кв.м.*



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влага (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хекто-литър
Северозападен	с. Лиляче	816	14,2	10,5	19,4	75,0
Северен Централен	с. Войново	846	8,4	14,1	28,2	77,0
	с. Тръстеник	712	9,4	12,6	21,6	75,7
Североизточен	гр. Шумен	475	9,1	14,1	27,5	72,4
Южен Централен	гр. Съединение	740	9,3	12,1	23,4	75,7
	с. Войсил	715	10,4	12,1	23,4	78,7
Югоизточен	с. Тенево	648	9,5	13,2	26,0	77,6

НАБУКО

супер премиум пшеница


- Ранна осилеста мека зимна пшеница, с висока производствена ефективност
- Пластичен. Понася късна сеитба и различни гъстоти на посева
- Егър и осилест клас
- Много гъвкав, устойчив на полягане
- Много добра братимост
- Силна пшеница с високо съдържание на протеин, висока хектолитрова маса

Препоръчителна сеитбена норма: 420-450 к.с./кв.м.*



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влага (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хекто-литър
Северозападен	с. Лиляче	620	13,6	11,5	21,7	73,7
Северен Централен	с. Войново	735	8,2	14,4	28,5	76,8
Североизточен	гр. Шумен	514	9,1	14,6	28,0	77,4
Южен Централен	гр. Съединение	806	9,6	11,2	21,0	76,5
	с. Войсил	625	10,0	11,3	21,5	75,5
	с. Дъбене	430	8,6	14,1	27,9	78,4
	с. Черничево	606				73,0
Югоизточен	с. Тенево	621	9,8	14,1	27,9	74,9
	гр. Ст. Загора	580	9,6	15,1	30,7	67,7

КАРОНТЕ

добив и качество без компромис

- Ранна зимна мека пшеница
- Безосилест сорт с червено зърно, средно високи растения
- Много енергичен, еластичен и адаптивен
- Разгръща добивен потенциал и при по-екстензивни условия
- Отличава се с голям и издължен клас (броя зърна в клас при добри условия може да надвиши 60 зрънца)
- Висока братимост. Братята са с много добра поносимост помежду си и силно изравнени
- Добра зимоустойчивост
- Високо съдържание на протеини (12-14)
- Много висок производствен потенциал

Важно!

КАРОНТЕ ИЗИСКВА НАВРЕМЕННА И ПРЕВАНТИВНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!


При интензивно отглеждане се препоръчва прилагането на растежен регулатор. Неалтернативен тип, който изисква сеитба в нормалните технологични срокове за региона.

Препоръчителна сеитбена норма: 350-420 к.с./гkа*



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влага (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хектолитър
Северен Централен	с. Войново	798	8,5	13,3	26,3	80,2
	с. Тръстеник	781	9,8	12,4	20,5	75,8
Североизточен	гр. Шумен	626	9,4	13,6	26,3	74,4
Южен Централен	гр. Съединение	787	9,9	12,0	23,2	79,6
	с. Войсил	652	10,4	14,2	28,4	77,9
	с. Дъбене	480	8,7	13,5	26,9	80,6
Югоизточен	с. Тенево	480	9,9	14,1	27,7	78,0
	гр. Ст. Загора	628	9,5	15,6	31,2	71,9

щедра отплата за вложенията


- Средноранна осилеста мека зимна пшеница
- Ниски растения, без остатъчна слама
- Едър и плътен клас
- Здраво стъбло и много добър общ фитосанитарен профил
- Бързо наливане на зърното
- Устойчив на полягане и неблагоприятни условия
- Адаптивен
- Изисква висок агрофон за разгръщане на потенциала си
- Постоянен в добива през годините
- Стандартна хлебна пшеница със съдържание на протеини над 12

Препоръчителна сеитбена норма: 500-550 к.с./кв.м.*



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влага (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хекто- литър
Северозападен	с. Лиляче	616	13,3	10,8	20,1	77,9
Северен Централен	с. Войново	730	8,2	14,0	27,6	80,6
	с. Тръстеник	672	9,0	13,2	22,9	80,0
Североизточен	гр. Шумен	532	9,0	14,0	26,9	76,1
Южен Централен	гр. Съединение	770	9,4	10,9	20,4	79,5
	с. Войсил	717	10,7	12,9	25,1	81,2
	с. Дъбене	400	8,4	14,0	27,5	81,9
Югоизточен	гр. Ст. Загора	571	9,8	15,2	30,4	80,0

ДЖОРДЖОНЕ

зрънце сила с високи W стойности


- Премиум мека пшеница с широка адаптивност към различни условия на отглеждане и добра толерантност към фузариум
- Формира издължен осилест клас
- Съчетава добивност с отлично качество на зърното
- Отлично допълва сорта Набуко, който е по-ранна премиум пшеница, вече доказала своя потенциал и предимства в много стопанства в страната, и дава възможност за една добра диверсификация в сортоструктурата на стопанствата, работещи в този сегмент и разпределение на риска

Препоръчителна сеитбена норма: 500-550 к.с./кв.м.*



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влага (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хектолитър
Северозападен	с. Лиляче	675	13,7	12,3	23,0	78,5
Северен Централен	с. Войново	760	8,2	15,2	30,4	81,3
	с. Тръстеник	747	9,7	13,2	25,7	81,3
Североизточен	гр. Шумен	510	8,9	14,9	28,8	77,0
Южен Централен	гр. Съединение	770	9,3	14,5	28,6	79,6
	с. Войсил	693	9,9	13,5	26,1	82,4
Югоизточен	с. Тенево	713	9,1	14,6	28,4	82,3

РЕЗУЛТАТИ МЕКА ПШЕНИЦА СЕЗОН 2024/2025

Регион СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН

Локация	Сорт	Добиѱ (kg/gka)
с. Войново	Сакраменто	846
	Рубиско	800
	Каронте	798
	Джорджоне	760
	Набуко	735
	Катуло	730
с. Тръстеник	Рубиско	793
	Каронте	781
	Джорджоне	747
	Сакраменто	712
	Катуло	672

Регион СЕВЕРОИЗТОЧЕН

Локация	Сорт	Добиѱ (kg/gka)
гр. Генерал Тошево	Сакраменто	655
	Рубиско	592
	Катуло	568
	Каронте	510
	Джорджоне	470
гр. Шумен	Каронте	626
	Рубиско	548
	Катуло	532
	Набуко	514
	Джорджоне	510
	Сакраменто	475

Регион СЕВЕРОЗАПАДЕН

Локация	Сорт	Добиѱ (kg/gka)
с. Лиляче	Сакраменто	816
	Рубиско	714
	Джорджоне	675
	Каронте	620
	Набуко	620
	Катуло	616

РЕЗУЛТАТИ МЕКА ПШЕНИЦА СЕЗОН 2024/2025

Регион ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН

Локация	Сорт	Добиѱ (kg/gka)
гр. Съединение	Набуко	806
	Каронте	787
	Джорджоне	770
	Катуло	770
	Сакраменто	740
	Рубиско	715
с. Войсил	Катуло	717
	Сакраменто	715
	Джорджоне	693
	Рубиско	654
	Каронте	652
	Набуко	625
с. Черничево	Набуко	606
с. Дъбене	Каронте	480
	Набуко	430
	Катуло	400

Регион ЮГОИЗТОЧЕН

Локация	Сорт	Добиѱ (kg/gka)
с. Тенево	Джорджоне	713
	Сакраменто	648
	Набуко	621
	Каронте	480
гр. Стара Загора	Каронте	628
	Набуко	580
	Катуло	571
	Рубиско	503



ТВЪРДА ПШЕНИЦА

- НЕГУС
- ЗЕТАЕ
- ФАРАХ

МНОГО ВИСОК ПРОДУКТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

- Средно късен (3-4 дни след Фарах)
- Много енергични и здрави растения
- Много продуктивен, с висока способност за братене
- Много добра зимоустойчивост
- Идеален за ранна сеитба
- Отличен качествен профил
- Устойчив на кафява ръжда

Препоръчителна сеитбена норма: 300-350 к.с./кв.м



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 20-30%.

ЗЕТАЕ

ТОП СТАНДАРТ ПРИ ТВЪРДИТЕ ПШЕНИЦИ

- Много ранен, осилест сорт (черни осили към момента на узряване)
- Нискостъблен, с ранен цъфтеж
- Много устойчив на стуг и полягане
- С добра толерантност към икономически важните болести, особено брашнеста мана
- Къс цикъл на вегетация, с който се цели да се избегнат евентуални късни летни дъждове и бури, които сериозно могат да компрометират и добива и качеството
- Алтернативен тип, който понася и много късна сеитба - до средата на февруари


Важно! Последен се сее, първи се жъне!

Препоръчителна сеитбена норма: минимум 550-600 к.с./кв.м.*



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влага (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хекто-литър
Северен Централен	с. Тръстеник	411	9,3	13,6	27,1	82,5
Североизточен	гр. Шумен	407	8,8	17,5	36,3	75,2
Южен Централен	с. Иваново	694	7,7	14,5	28,1	83,4
	гр. Раковски	480	8,4	16,5	34,1	79,0
Югоизточен	с. Тенево	586	8,9	17,0	35,2	79,6
	с. Ботево	650	11,2	15,2	31,3	76,1
	с. Зимница	540		16,0		82,0

отлична корелация производителност: качество


- Средно ранен, осилест сорт (черни осили към момента на узряване)
- Пластичен и адаптивен
- Средно високи растения с добра толерантност на полягане
- Толерантен към хлортолурон
- Висок глутенов индекс

Препоръчителна сеитбена норма мин. 450 – 500 к.с./м²



* За сеитба в оптимални срокове. При късна сеитба е необходимо увеличение на сеитбената норма с 10-20%.

Резултати сезон 2024/2025



Регион	Локация	Добив (kg/gka)	Влага (%)	Протеин (%)	ДМГ (%)	Хекто-литър
Северозападен	с. Липница	686		15,6	32,0	81,5
Югоизточен	гр. Несебър	800	10,0	12,8	25,8	85,7
	с. Зимница	650		14,0		82,0
	с. Малко Шарково	500	8,7	14,2	27,3	85,0
Южен Централен	с. Иваново	787	8,0	13,8	26,5	85,6
	с. Дълбок извор	500	10,0	12,7	28,1	79,5

РЕЗУЛТАТИ ТВЪРДА ПШЕНИЦА СЕЗОН 2024/2025

РЕГИОН СЕВЕРОЗАПАДЕН

Локация	Сорт	Добив (кг/га)
гр. Червен бряг	Зетее	450
с. Липница	Фарах	686

РЕГИОН СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН

Локация	Сорт	Добив (кг/га)
с. Сушица	Зетее	700
с. Тръстеник	Зетее	411

РЕГИОН СЕВЕРОИЗТОЧЕН

Локация	Сорт	Добив (кг/га)
гр. Шумен	Зетее	407

РЕГИОН ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН

Локация	Сорт	Добив (кг/га)
с. Иваново	Зетее	694
гр. Раковски	Зетее	480
с. Иваново	Фарах	787
с. Дълбок извор	Фарах	500

РЕГИОН ЮГОИЗТОЧЕН


Локация	Сорт	Добив (кг/га)
с. Ботево	Зетее	650
с. Тръстиково	Зетее	600
с. Тенево	Зетее	586
с. Зимница	Зетее	540
с. Тенево	Зетее (пролетна сеитба)	550
с. Пчела	Фарах	1100
с. Кукорево	Фарах	810
гр. Несебър	Фарах	800
с. Зимница	Фарах	650
с. Тенево	Фарах	618
гр. Каблешково	Фарах	585
с. Малко Шарково	Фарах	500

БОНЖУР

- Алтернативен, ранен сорт тритикале
- Висока толерантност на мана и жълта ръжда
- Толерантен на кафява ръжда и ринхоспориум
- Добра толерантност на полягане
- Понася късна сеитба
- Пластичен и адаптивен

Посевна норма 500-550 к.с/кв.м.

Резултати сезон 2024/2025




ИНТЕГРАЛ

- Ранен, 6 редов зимен ечемик
- Висока толерантност на ръжда, ринхоспориум, хеминтоспориоза и рамулария
- Устойчив на вируса BYDV жълто ечемичено вджуджаване
- Добра толерантност на оронване и пречупване на класа
- Много добра толерантност на полягане
- Добра зимоустойчивост
- Пластичен
- Високо хектолитрово тегло

Посевна норма 18-20 kg/gka

Резултати сезон 2024/2025



ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ХРАНЕНЕ НА ПШЕНИЧНИТЕ ПОСЕВИ (мека и твърда зимна пшеница)

За формирането на **100 кг зърно** и съответната вегетативна маса пшеницата извлича от почвата **2,5 – 3,5 кг N**, **1,0 – 1,5 кг P** и **2,5 – 3,0 кг K**. За усвояването на всеки 10-12 кг азот е нужен около 1 кг от всеки от елементите сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Ca). От микроелементите Cu, Mn, Zn, B, Fe – съответно между 1 и 14 гр за 100 кг добив. В повечето случаи естественото плодородие на почвите в България осигурява добиви от 100-150 кг/дка, като само при някои по-богати черноземи, смолници и канелено горски почви може да се достигне до 200-250 кг/дка без торене.

Подхранването с амониеви и серни торове е гаранция за постигане на по-добри резултати като добив и качество на зърното.

Специалистите по хранене на културите на фирма СЕМБОДИА ще Ви помогнат в избора на конкретни продукти и изработването на цялостна технология за хранене, адаптирана според нуждите на конкретното поле/земище, планирания добив (когато се прилага тази практика), влиянието на агро-метеорологичните фактори върху културата през отделните ѝ фази на развитие, генотипният отговор на типа/сорта пшеница. Най-ефективната технология за хранене се изработва на база регулярни анализи на почва и растителна тъкан, за прецизно установяване на нуждите от хранителни елементи за културата.

Доброто влияние на листните торове и биостимуланти за третиране на семената, както и за подхранване през есента и през пролетта с цел корекция на храненето, преодоляването на термичен и хидратен стрес, подобряване качеството на зърното, са съществен елемент от цялостната програма на хранене и не бива да бъдат подценявани.

Признаците на хранителни дефицити трябва да се отчитат върху младите растения преди да са достигнали 15 - 20 см височина. Много често проявите на минерално гладуване в по-късни фази от развитието на пшеничните растения се маскират от появата на болести и от повреди с различен произход, което силно затруднява диагностиката им.

Доброто хранене на пшеничните посеви не е в самоцелното прилагане на отделни торови продукти, а в прецизното им съчетаване в технологии на хранене.

Сембодин ООД

2025 г.



СЕМБОДИЯ СЕМЕНА
ул. "Осогово" 51, ет. 5
1303 София
0878 509 897
seeds@sembodja.bg